

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

**KILTIX® collar**

**ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

- 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ**

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:

**BAYER ANIMAL HEALTH GmbH**

D-51368 Leverkusen, Germany

- 2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

**KILTIX collar**

- 3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ**

Ανά περιλαίμιο:

Δραστικά συστατικά:	Ποσότητα (g)		
	Μικρό	Μεσαίο	Μεγάλο
2-Isopropoxyphenyl-N-methylcarbamate	1,250	3,020	4,500
Flumethrin	0,281	0,680	1,013

**Έκδοχα:**

Di-n-butyl adipate

Propylene glycol octanoate-decanoate

Epoxidized soybean oil

Stearic acid

Titanium dioxide

Iron oxide yellow

Polyvinyl chloride

- 4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)**

Το KILTIX collar χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση των κροτώνων (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) και των ψύλλων (*Ctenocephalides canis* και *Ctenocephalides felis*) του σκύλου και για την πρόληψη νέας προσβολής. Η αποτελεσματικότητά του κατά των εξωπαρασίτων διαρκεί έως 7 μήνες, εφόσον φοριέται συνεχώς.

- 5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ**

Να μη χρησιμοποιείται σε σκύλους με εκτεταμένες δερματικές αλλοιώσεις.

Να μη χρησιμοποιείται σε άρρωστους σκύλους ή σε ζώα που βρίσκονται στο στάδιο της ανάρρωσης.

- 6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**

Σε μερικές περιπτώσεις (3% περίπου) έχει αναφερθεί, κατά τις πρώτες ημέρες μετά την τοποθέτησή του, πρόκληση ενός ελαφρού παροδικού κνησμού. Σε περίπτωση αλλεργικών αντιδράσεων το περιλαίμιο θα πρέπει να αφαιρείται.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο

παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικά τον κτηνίατρό σας.

## 7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Σκύλος

## 8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

**Μικρόσωμοι σκύλοι:** ένα περιλαίμιο μήκους  $380 \pm 38,0$  mm

**Μεσαίου μεγέθους σκύλοι:** ένα περιλαίμιο μήκους  $530 \pm 53,0$  mm

**Μεγαλόσωμοι σκύλοι:** ένα περιλαίμιο μήκους  $700 \pm 70,0$  mm

### Τρόπος εφαρμογής

Αφαιρέστε το περιλαίμιο από τη θήκη του και ξεδιπλώστε το. Τοποθετήστε το περιλαίμιο χαλαρά γύρω από το λαιμό του σκύλου και τραβήξτε το ελεύθερο άκρο διαμέσου της πόρπης. Να ελέγχεται η σωστή τοποθέτηση του περιλαίμιου κατά τακτά διαστήματα.

Τις πρώτες δύο ημέρες να ελέγχεται η περιοχή του δέρματος, όπου βρίσκεται το περιλαίμιο και να εξασφαλίζεται ότι το περιλαίμιο δεν είναι πολύ σφιχτό (να υπάρχει διάστημα πάχους δύο δακτύλων μεταξύ του περιλαίμιου και του δέρματος).

Το περιλαίμιο πρέπει να φοριέται συνεχώς. Δρα είτε ο σκύλος είναι δραστήριος είτε είναι ήσυχος. Περιστασιακά, μπορεί να παρατηρηθεί παρασίτωση από κρότωνα, ενώ χρησιμοποιείται το περιλαίμιο. Οι κρότωνα είναι δυνατό να υπάρχουν, αλλά πεθαίνουν το πολύ εντός 3 ημερών, χωρίς να έχουν απομυζήσει αίμα.

Η αποτελεσματικότητά του κατά των κροτώνων και των ψύλλων αρχίζει εντός 24 ωρών από τη χρήση του και διαρκεί για 7 μήνες.

Η διάρκεια και το επίπεδο προστασίας εξαρτάται από το μήκος, την πυκνότητα και την κατάσταση της τρίχας, τη δραστηριότητα του ζώου και το βαθμό της παρασίτωσης.

Αντικαταστήστε το περιλαίμιο νωρίτερα, όταν ελαττώνεται η αποτελεσματικότητά του.

Οι σκύλοι με απεριποίητο, θολό ή λιπαρό τρίχωμα να πλένονται πριν από την τοποθέτηση του περιλαίμιου.

Να αφαιρείται το περιλαίμιο σε περίπτωση λουτρού ή θαλάσσιου μπάνιου του σκύλου και να επανατοποθετείται, όταν το τρίχωμα είναι στεγνό. Η συνεχής έκθεση του τριχώματος του σκύλου σε νερό (βροχή, κολύμβηση, λουτρό) μπορεί να ελαττώσει την αποτελεσματικότητα του περιλαίμιου.

## 9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Ως γενικός κανόνας προφύλαξης και για άλλους αντιπαρασιτικούς παράγοντες, συνιστάται να μη χρησιμοποιούνται άλλα παρασιτοκτόνα στο σκύλο, όσο φέρει το περιλαίμιο.

Σε περίπτωση δηλητηρίασης από καρβαμιδικά, χρειάζεται συμπτωματική θεραπεία και ενδομυϊκή χορήγηση αντιδότου, που είναι η ατροπίνη.

## 10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Δεν απαιτείται.

## 11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των  $25^{\circ}\text{C}$ , προστατευμένο από το φως.

## 12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

Να μη χρησιμοποιείται σε άλλα είδη ζώων, τα οποία προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Να αποφεύγετε την υπερβολική επαφή με το περιλαίμιο τη στιγμή της εφαρμογής. Μετά την εφαρμογή να πλένετε καλά τα χέρια.

Άτομα με ευαισθησία στα συστατικά του KILTIX collar να αποφεύγουν την επαφή με το περιλαίμιο.

Να μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με το περιλαίμιο.  
Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά. Να φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα και ποτά.  
Να μη χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης.  
Να ανοίγεται η συσκευασία, μόνο όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το περιλαίμιο.  
Το KILTIX collar είναι τοξικό για τις μέλισσες και τα ψάρια.

**13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

**14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

**15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**

Κουτί με κίτρινο περιλαίμιο για μικρόσωμους σκύλους μήκους  $380 \pm 38,0$  mm σε σακουλάκι αλουμινίου

Κουτί με κίτρινο περιλαίμιο για μεσαίου μεγέθους σκύλους μήκους  $530 \pm 53,0$  mm σε σακουλάκι αλουμινίου

Κουτί με κίτρινο περιλαίμιο για μεγαλόσωμους σκύλους μήκους  $700 \pm 70,0$  mm σε σακουλάκι αλουμινίου

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Οι κρότωνες (τσιμπούρια) είναι εξωπαράσιτα που απομυζούν αίμα από τα ζώα και τον άνθρωπο. Πολλές φορές, σε περιπτώσεις σχετικής νόσου των ζώων ή των ανθρώπων, μαζί με το αίμα προσλαμβάνουν και διάφορα βακτήρια, ρικέτσιες ή ιούς, οι οποίοι εγκαθίστανται και πολλαπλασιάζονται μέσα στους κρότωνες. Στις περιπτώσεις αυτές οι κρότωνες δρουν ως βιολογικοί μεταφορείς των παθογόνων αυτών αιτιών και έτσι μπορούν να μεταφέρουν από τα ζώα στον άνθρωπο τα λοιμογόνα αίτια ορισμένων νοσημάτων, όπως για παράδειγμα την μπορρέλια της νόσου Lyme και τον ιό της εγκεφαλίτιδας. Επιπλέον, οι κρότωνες αποτελούν και τον ενδιάμεσο ξενιστή ορισμένων αιμοπρωτοζώων του σκύλου, όπως είναι η *Babesia*.

Οι ψύλλοι βρίσκονται όχι μόνο στο σκύλο αλλά και στο περιβάλλον του, όπως στο χώρο όπου κοιμάται, στο έδαφος, στο χαλί, στα έπιπλα και την αυλή. Με σκοπό να προληφθεί περαιτέρω μόλυνση του σκύλου, είναι σημαντικό παράλληλα με το περιλαίμιο να εξυγιανθεί το περιβάλλον του σκύλου όσο και ο ίδιος ο σκύλος (με εξωπαρασιτοκτόνα).

Οι ψύλλοι είναι και ενδιάμεσοι ξενιστές του *Dipylidium caninum* του σκύλου. Είναι γεγονός ότι όπου υπάρχουν ψύλλοι υπάρχουν και ταινίες. Επομένως, συγχρόνως με τη θεραπεία κατά των ψύλλων, οι σκύλοι καλό θα είναι να θεραπεύονται και για το *Dipylidium* (με ταινιοκτόνα).

Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας: 756/09-01-2013/K-0081701

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

**\*χορηγείται με συνταγή κτηνιάτρου\***

**ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ**

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777**